n° 17.

Le 10 janvier 1751 je vis une petite fille de 4 mois de Jean Mauran porte faix, qui avoit le genoüil droit extremement gonflé, presque point sensible, excepté lorsque je voulois faire la flection du genoüil, la peau avoit sa couleur ordinaire, et au lieu d'avoir une certaine chaleur, etoit plus froide que dans l'état naturel et malgré un petit fond de fievre lente, autant qu'on peut le distinguer à cet âge, conservoit assez d'embonpoint. Les questions que je fis à la mere & necessaires pour decouvrir ce qui y avoit donné lieu furent inutiles, et ce ne fut que par l'inquietude de l'enfant dans certains mouvements, qu'elle s'apercut du lieu ou elle souffroit & qui dans 8 ou 10 jours, vint dans l'état ou je la voyois, ne reconnoissant aucune luxation, je luy prescrivis des cataplasmes emolients & et resolutifs, qu'on m'a dit avoir été continués 5 ou 6 jours, je la revis alors, l'état de son poulx etoit le meme, mais la tumeur avoit augmenté & la peau commencoit à devenir luisante, sans cependant changer de couleur, n'y determiner, ou le pus se presenteroit, ce que j'examinay avec attention, persuadé qu'il y en avoit de fait, ou qu'il y avoit de la sinovie dans l'article en quantité, & qui avoit acquis un caractere aigre ou acre, je leur substituay aux cataplasmes emolients & resolutifs, les cataplasmes anodins souvent changés. Je la revis le 18e & je reconnus, à la partie un peu anterieure lattéralle externe de la cuisse, à la naissance du condile externe une fluctuation profonde, j'y fis apliquer du supuratif ~~& par dessus un emplastre de diachilum gomme~~ depuis ce jour la fievre s'aluma, toute la circonferance du genoüil devint douloureuse, il se repandit sur cette partie une chaleur & une rougeur erisipelateuse. Le 20 la fluctuation etant plus sensible, j'ouvris longitudinalement la peau & le facia lata sous lequel etoit le pus. apres quoy sur mon doigt, j'alongeay mon incision, autant que je trouvay du vuide & des brides, & je coupay transversalement le facia lata aux deux cottés, cette incision s'etendoit, depuis la partie moyenne, inferieure externe du femur vers les attaches inferieures du vaste externe, jusqu'au tibia, d'ou il sortit quantité de pus sereux & fœtide, la playe fut pancée selon l'art, et le 21. 22. 23. & 24 avec un digestif, fait avec l'huile d'ypericum, le basilicum & le beaume d'arceus. Quoique la supuration fut assez abondante pendant tous ces jours la fievre ne ceda point, le fond de la playe me parut faire bosse, ce qui me fit soupconner du pus plus profondement, mais n'y sentant point de fluctuation, je remis au lendemain 25 une operation que je jugeay necessaire, & faite avec circonspection, ce que je fis en plongeant mon bistouri dans la partie presque superieure de la playe (a fin de ménager la capsule si elle etoit saine) jusqu'a ce que je trouvay le pus, qui etoit en quantité, et que je croyois devoir me diriger, dans l'etendue des incisions pour cet effet je mis mon doigt dans le sac, et sur luy je les etendis jusqu'au tibia ou il me parut se borner, la playe fut pancée selon l'art

Le 26. 27. 28. 29. 30. & 31 la supuration devint chaque jour plus abondante que je ne devois l'attendre, et les chairs s'elevoint mollement. Le 1er fevrier...

L'apareil

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

HRC41 n° 108

l'apareil se trouva beigné de serosité, les chairs presentoint un caractere scrophuleux et j'aperceux au côtté oposé sur l'articulation interieurement, et un peu posterieurement plus d'elevation et de tension qu'il n'y en avoit les jours precedents, quoique cette partie eut toujours conservé plus de volume que dans l'état naturel, et par la compression que je fis pour sentir s'il y avoit de la fluctuation, je vis le chapor au travers de quelque point du fond inferieur de la playe de la serosité mellée de pus, ce qui me fit craindre que la capsule ne fut ouverte accidentelement par la presence de la mauvaise qualité du pus, si l'articulation n'étoit elle meme le siege de la maladie, la playe fut pancée à l'ordinaire. Le 2 & le 3 je ne vis point coulée de serosité, la playe supura à son ordinaire, les chairs qui s'étoint elevées, avoint une couleur cendrée, avec quelques points brillants, l'enfent avoit ésté inquiet les deux nuits, la fievre avoit augmenté, et son embonpoint qui s'étoit asses soutenu, parut cesser tout d'un coup.
Le 4 l'apareil se trouva beigné d'un pus sereux, et le fond de la playe recouvert de chairs fongeuses plus cendrées que la veille, ce que j'ay remarqué aux maladies des grosses articulations, et qui degenerent en scrophuleuses, et aux parties qui environnent les parties membraneuses, qui sont dans le cas de mortification.
Pour m'assurer de l'ouverture de la capsule, je pressay doucement la tumeur du côtté oposé, et je cessay, dès que j'aperceux coulée de la serosité, pour introduire mon doigt en ce lieu, afin ~~que par une seconde pression, je peusse sentir le flot du liquide s'il y en avoit~~, par cette pression il en coula tout le long de mon doigt, certain que la capsule étoit ouverte, et que j'étois sur l'ouverture, j'y introduisis ma sonde, à sa faveur & sans le deplacer, elle traversa l'articulation sans nulle resistance et se fit sentir au côtté oposé, interieurement et un peu posterieurement, je la retiray pour introduire mon petit doigt dans l'articulation sans que l'ouverture de la capsule fit une certaine resistance. Les bords du condile externe celui de la rotule et du tibia que je touchay me parurent conserver leur poli, je mis en ce lieu de la charpie seche, je pançay la playe à l'ordinaire
Le 5 je prié Monsieur Listalde mon confrere de se trouver au pancement, afin de determiner, s'il ne conviendroit pas d'ouvrir le sac qui étoit à la partie interne du genoüil, avant d'en venir à l'amputation de la cuisse. Veu l'âge de l'enfent nous primes le 1^{er} parti, et sur le champ, je fis une incision sur la pointe de ma sonde, afin de menager les muscles flechisseurs de la jambe, et y ayant introduit mon doigt, je l'étendis haut et bas, les playes furent pancées selon l'art, cette incision qui étoit à la partie interne un peu posterieure de l'articulation, s'etendoit, demi pouce plus haut, et un poulce plus bas qu'elle, et repondoit par sa partie superieure, à la partie presque inferieure de la playe du côtté oposé. La derniere playe presenta le meme caractere que la premiere dès le second pancement, & le pus sereux qui continuoit d'inonder l'apareil, me fit presumer, que l'articulation étoit le siege de la maladie, et qu'il faloit songer de sauver la vie de l'enfent au prix d'un membre. mais avant d'en venir là, je crus devoir tout tenter, sans cependant perdre du tems, et suprimer, à raison des parties membraneuses, et de leur tissu delicat à cet âge

tout

tout pourrissant & pancer la 1ere playe avec du mundificatif d'ache & la derniere
avec l'huile d'hypericum & le beaume d'arceus. Cela ne changea, ny l'état de la
playe, ny la quantité, ny la qualité du pus
Le 10 jour arresté pour faire l'amputation, la cuisse se trouva couverte d'une
Eresipelle qui gagna le 11 toute la fesse, La fievre etoit des plus vives
L'enfant qui etoit naturellement tranquille fut dans des inquietudes continuelles
mellées de quelques foiblesses. Le 12 voyant que l'operation n'etoit pas
praticable. Je mis en usage les eaux de barreges. tant en injection, pour
netoyer les fonds de la playe & l'articulation, que pour en imbiber les bordonets
& les plumaceaux. Le 13 j'apercus que l'injection introduite par la playe
du côté externe, sortoit baveusement du côté oposé, d'ou j'inferay, que l'ouverture
du côté interne de la capsule etoit plus grande, j'y introduisis un bordonet molet et
long trempé ainsi que je l'ay dit, et enduit de beaume d'arceus et d'huille
d'hypericum qui traversa l'articulation sans resistance Le reste du
pancement fut des plus simples. Le 14 voyant que la fievre et l'Eresipelle
se soutenoient, apres avoir bien beigné l'articulation des eaux thermales tiedes,
je fis passer un seton de charpie de la grosseur d'un tuyeau de plumes d'un
côté à l'autre imbibé des memes ~~[illegible]~~ faisant le reste du pancement à
l'ordinaire, le tout couvert d'un linge qui portoit deux pouces de longeur
de plus que la circonference du genouil, lesquels deux pouces de l'un des bouts
etoit garni de diachilum gommé, afin qu'en se croisant, il contint l'apareil,
pour n'estre pas obligé de serrer la bande qui maintenoit des compresses
imbibées d'eau de mauve & repetées souvent. Depuis ce jour je fis prendre
à l'enfant à diverses reprises du sirop de fleurs de peches, qui le vuida beaucoup.
au bout de quelques jours l'Eresipelle disparut, mais la fievre se soutenoit, et
l'etat de l'enfant, ne permettoit pas de tenter l'amputation, & le seul avantage
qui se presentoit, c'est que le pus ne croupissoit plus dans l'article. Le 21 en
introduisant ma seringue dans l'ouverture de la capsule du côté interne du genouil,
j'apercus qu'elle y badinoit, et par consequent qu'il devoit estre tombé quelque
escarre, ce qui me determina à abandonner le seton & mettre simplement sur
les bords des ouvertures de la capsule, un peu de charpie imbibé des eaux
de barreges avec du mundificatif. Ce qui fut continüé jusqu'au commencement
de mars. alors je fis purger l'enfant, & je me servis tant pour les injections,
que pour le pancement des memes eaux. La fievre tomba insensiblement,
la quantité de la matiere diminua peu à peu & se rendit louable, l'ouverture
de la capsule du côté interne cessa de fournir le 20e mars. Et celuy du côté
externe peu de jours apres. Des que je n'apercus plus de serosité je fis cesser les injections,
du vin miellé ou de la charpie sec, suivant l'etat des chairs, termina la curation Le 12 avril

Reflexion

La froideur et la tension de tout le genoüil, sans œdeme, sans douleur, sans fluctuation, sans changement de couleur à la peau, dans les premiers tems, avec un fond de fievre lente. Le caractere du pus & des chairs dans le cours du traitement, ne presentent ils pas une maladie scrophuleuse dans sa naissance; mais aussi ne pourroit elle pas estre accidentelle, par quelque tiraillement irregulier que la mere auroit peu faire à l'articulation, qui n'auroit pas esté violent par raport à elle, mais excessif par raport à l'enfant, et qui en ce cas, auroit porté sur quelques uns de ses ligaments, ou sur la capsule elle même, et le caractere scrophuleux que presentoit la playe, estre accidentel, les maladies des grosses articulations prenant ce caractere, suivant le degré de depravation des liqueurs.

Le caractere du pus et des chairs sont à la verité communs à la carie, mais elle n'a pas esté connüe, et il est à presumer que s'il y en eut eu, la guerison auroit esté au moins plus retardée, et suivant le lieu ou elle auroit esté, suivie d'ankilose ou de fistule, on demandera peutêtre comment un bordonet long et molet à peu passer sous la rotule, attendu la force des ligaments & de la capsule, à cet âge, ils sont plus susceptibles de prettes que de resistance, les matieres qui ont croupi, peuvent les avoir distendües en raison reciproque de la quantité contenüe dans l'article, le gonflement même s'il n'est pas general deplace les parties, surtout la rotule, à proportion qu'il produit du racourcissement d'un côté, et que l'oposé est susceptible de pretes, par consequent il y aura une distance entre le tibia & la rotule, s'il est aux attaches des muscles extenseurs de la jambe, et entre elle et le femur s'il est à elle ou tibia, peutêtre même les cartilages semilunaires, ayant à cet âge fort peu de consistance, etoint ils detruits, chacun de ces differens cas auront produit du vuide,

mais comment la capsule dont la supuration conduit communement à la necessité de l'amputation, ou au moins à une fistule, s'est elle reunie, à l'âge de Côte l'enfent l'abondance des sucs nourriciers, tendent à l'alongement des fibres, de meme que le lait qui en fait l'unique nourriture, mais comment la playe externe ayant esté ouverte la premiere, a t'elle esté guerie la derniere, l'enfent au berceau et emmaillotté à raison du poids des fesses, a les jambes plus hautes que les genoüils, le condile interne baisse aussi plus que l'externe. La scituation des deux playes, l'une à la partie externe un peu anterieure & inferieure de la cuisse, l'autre à la partie [illegible] latteralle interne un peu posterieure, traversant l'articulation de haut en bas, superieure et inferieure l'une par raport à l'autre, ont à raison de cette pente contribué à sa reunion......

Lafargüe lieut. de M. Le P.r Ch.en à Bayone